

制酸・緩下剤

マグミット[®]錠100mg・細粒83%

小児用量 換算表

体重に応じた開始用量(40mg/kg/日)の目安

体重	100mg錠/日	細粒83%/日	体重	100mg錠/日	細粒83%/日
7.5kg以上	3錠	360mg	25kg以上	10錠	1200mg
10kg以上	4錠	480mg	27.5kg以上	11錠	1320mg
12.5kg以上	5錠	600mg	30kg以上	12錠	1440mg
15kg以上	6錠	720mg	32.5kg以上	13錠	1560mg
17.5kg以上	7錠	840mg	35kg以上	14錠	1680mg
20kg以上	8錠	960mg	37.5kg以上	15錠	1800mg
22.5kg以上	9錠	1080mg	40kg以上	16錠	1920mg

6. 用法及び用量（電子添文より一部抜粋）

小児

〈緩下剤として使用する場合〉

通常、1歳以上の小児には酸化マグネシウムとして、1日20～80mg/kgを食後の2回に分割経口投与する。

7. 用法及び用量に関する注意

〈緩下剤として使用する場合〉

7.1 小児は1日40mg/kgを開始用量の目安とし、患者の状態に応じて適宜増減すること。[17.1.1参照]

※ご使用に際しましては、電子添文をご参照下さい。