

外皮消毒剤 指定医薬部外品

エタノール(76.9~81.4vol%)含浸綿

アルコール カット綿 シオエ

4cm×4cm 104枚

開封日

年 月 日


販 売 名	デザインa
成 分 (薬液100mL中)	日局エタノール 83mL 日局イソプロパノール 3.7mL 日局精製水 適量
内 容 量 (1パック中)	薬液 98mL 脱脂綿(4cm×4cm、104枚)20g
効能・効果	手指・皮膚の洗浄・消毒
用法・用量	使用時本品を開いて脱脂綿を取り、 適用部位に塗布・清拭する。

※使用に際しては裏面の説明書きをよく
読んでください。

開封前に、一度だけ容器を逆さま
にし脱脂綿部分を軽く押すと、薬
液が脱脂綿全体に含浸されます。
その後、中フタをはがしてご使用
ください。



製造
番号
使用
期限



【販売】

日本新薬株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

【発売】

シオエ製薬株式会社
兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

【製造販売元】

丸三産業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地
お客様相談室 TEL(0893)25-1486
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日は除く)



4 987173 071791

火気注意

MADE IN JAPAN



容 器 : PP
外フタ : PET
中フタ : PP,PET
外 装 : PP



ご使用上の注意

使用に際しては、この説明書きをよく読んでください。

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

〈用法・用量〉

使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 粘膜へは使用しないこと。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 火気に近づけないこと。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな^{はん}斑点状のものが見られることがあります。これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心してお使いください。