

※【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者（「(1)相互作用」の項参照）

【組成・性状】

本品 100 mL 中、セネガ4 gを含む。
添加物として、白糖、エタノール、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピルを含む。本品は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なにおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難
急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日 10～35 mL を3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

※(1)相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム（ノックピン） シアナミド（シアナマイド） カルモフル（ミフロール） プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。



去たん剤

※2009年7月改訂（第3版）
2005年6月改訂
貯法：気密容器
製造番号 ラベルに記載
使用期限

本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採取時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。

日本標準商品分類番号 872231	
承認番号	(61AM)930
薬価収載	1950年9月
販売開始	1949年1月
再評価結果	1981年8月

日本薬局方

セネガシロップ

Senega Syrup

セネガシロップ シオエ

500mL



製造販売元



シオエ製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販売



日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質（セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシセフナトリウム）メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2)副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

●その他の副作用

種類/頻度	頻度不明
大量投与	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

【薬効薬理】

咽喉などの粘膜刺激により舌咽神経を介して反射的に気道液分泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進して、去痰作用を現すものと推定される。

製造番号

使用期限

