

酸化マグネシウム製剤を服用中の患者さん・ご家族の方へ

● 酸化マグネシウム製剤の服用中に気をつけること

このおくすりは、まれに、「高マグネシウム血症」という副作用が起ることがあります。

次のような症状がみられましたら、「高マグネシウム血症」の可能性が
ありますので、このおくすりの服用をやめて、すぐに、この紙又は
このおくすりをもって、医療機関を受診してください。

高マグネシウム血症の初期症状

吐き気、嘔吐、立ちくらみ、めまい、脈が遅くなる、
皮膚が赤くなる、力が入りにくくなる、体がだるい、
傾眠(眠気でぼんやりする、うとうとする)

このおくすりを長く服用し続けている患者さん、腎臓に病気のある
患者さん、高齢の患者さんにおいて、「高マグネシウム血症」が多く報告
されています。特に便秘症の患者さんでは、腎機能が正常な場合や通常
服用する量でも重篤な例が報告されていますので、注意してください。

「高マグネシウム血症」は、放っておくと重い症状(息苦しい、意識が
もうろうとする、心停止)になることがありますので、早めに医療機関を
受診することが大切です。早めに発見し適切な処置をおこなえば大事に
至ることはほとんどありません。

マグミット細粒 83%

マグミット錠 200mg・250mg・330mg・500mg

製造販売元 マグミット製薬株式会社

発売 シオエ製薬株式会社

販売 日本新薬株式会社

重質酸化マグネシウム シオエ

製造販売元 シオエ製薬株式会社

販売 日本新薬株式会社

2015年10月作成

2020年 8月改訂